ЛИНИЯ УДОБРЕНИЙ ПРК «БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ»
УНИКАЛЬНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СТРЕССОВ

Контроль (без обработки)

Фотоокислительный ожог





Побурение кожицы плода
от солнечных ожогов (А),
некроз от солнечных ожогов (Б)





Вариант «ГК АгроПлюс»
БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ

Плоды без повреждений солнечными ожогами





ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са+Mg»
+ ПРК «Белый Жемчуг Универсальный Термощит» – трехкратная некорневая обработка с интервалом 10-20 дней

Защита от возвратных заморозков

В текущем сезоне возвратные заморозки нанесли серьезный урон плодово-ягодным культурам Крыма, ЮФО и ЦЧО. По данным д.с.-х.н. Балыкиной Е.Б. (ФГБУН «НБС-ННЦ»), испытания фитомодулятора ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» Антифриз (3 обработки 1,0%-ным раствором) в условиях неоднократных возвратных заморозков продемонстрировали высокую эффективность.

Результаты учетов 13.05.2025 года в Красногвардейском районе, р. Крым:

- На яблонях, обработанных препаратом, **количество сохраненных завязей** составило 10,6 шт./дерево, что **в 2,7 раза выше**, чем без обработки (3,9 шт./дерево).
- На черешне **сохранение завязей увеличилось в 3,5 раза**: 104,9 шт. на 4-х учетных опытных и 29,7 шт. на 4-х контрольных побегах.

Профилактические весенние обработки криопротектором-фитомодулятором «Белый Жемчуг Универсальный» Антифриз позволили снизить потери завязи на 10–60% в зависимости от погодных условий и физиологического состояния (уровня Брикс) плодовых почек.

Защита от солнечных ожогов

В результате данного обследования Балыкиной Е.Б. в Нижнегорском районе р. Крым установлено, что **применение комбинации препаратов ПРК «Белый Жемчуг Дрип Са + Mg» и ПРК «Белый Жемчуг Универсальный» Термощит позволяет полностью защитить плоды от негативного воздействия высоких температур и ультрафиолетового излучения.**

Повреждение плодов яблони от высокотемпературного стресса, Нижнегорский район, р. Крым, 2025 г.

Учеты ФГБУН «НБС-ННЦ» **03.09.2025 г.** по 1000 плодов с каждого варианта	**Фотоокислительный ожог:** фотообесцвечивание при Т>45°С		**Побурение плодов:** Т>46°С в течение часа + УФ-излучение		**Некроз:** отмирание кожицы при Т>50°С в течение 10 мин		**Стекловидность:** разрушение клеточных стенок из-за осмотического давления	
	шт.	**%**	**шт.**	**%**	**шт.**	**%**	**шт.**	**%**
Опыт (БЖУ Термощит)	34	3,4%	0	0%	0	0%	0	0%
Контроль (без обработок)	402	40,2%	86	8,6%	37	3,7%	35	3,5%

В опыте не выявлено плодов с признаками побурения кожицы, некрозами и стекловидностью, а процент повреждения фотоокислительным ожогом в 11,8 раз меньше, чем на контроле.

ООО «Группа Компаний АгроПлюс»
www.agroplus-group.ru
350072, г. Краснодар, ул. Шоссейная (Тополиный жилой массив тер.), № 2/2,
+7 (918) 436-36-49, +7-918-076-21-05,
+7-918-076-21-01, +7-928-413-97-02
info@agroplus-group.ru

Подписывайтесь, чтобы оставаться на связи:
удобрения, технологии питания растений, диагностика